ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА: СВЯЗЬ ФАКТОРОВ АНАМНЕЗА С РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ДЕТЕЙ

Зинина Н.В., Куприян К.В., Рудницкая Д.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
г. Минск, Республика Беларусь
электронная почта: gozd@bsmu.by

В рамках одномоментного исследования 546 пар «мать-ребенок» (с использованием авторской анкеты) проведена оценка биологического анамнеза (особенности раннего онтогенеза ребенка) и показателей резистентности детей в возрасте 6-10 лет за прошедший год.

Таблица 1 – **Характер течения беременности**	
Без особенностей	60%
Токсикоз 1-ой половины беременности	**24%**
Токсикоз 2-ой половины беременности	4%
Угроза прерывания	8%
Недоношенность	3%
Многоплодная беременность	2%




Рис. 1 – Способ родоразрешения




Рис. 2 – Употребление антибактериальных препаратов во время беременности

Таблица 2 – **Резистентность детей в возрасте 6-10 лет**	
Количество случаев простудных заболеваний за год	
1-4 раза в год	71%
Более 4-х раз в год	18%
Не болел(а)	11%
Длительность одного случая заболевания	
До 10 дней	88%
10 дней и более	12%




Рис. 3 – Первое прикладывание ребенка к груди




Рис. 4 – Длительность грудного вскармливания ребенка




Рис. 5 – Возраст первого введения прикорма

Установлены прямые корреляционные связи (r=0,73) между нарушениями режима грудного вскармливания и высокой кратностью острых респираторных заболеваний в младшем школьном возрасте (6–10 лет). Результаты демонстрируют феномен «метаболического программирования» и свидетельствуют о необходимости контроля за употреблением антибактериальных препаратов во время беременности и соблюдения рекомендаций по грудному вскармливанию.